


Q：弾性ストッキングは足背動脈と後脛骨動脈どちらかが触れていれば履かせてもいい？

A:
足背動脈は足背側、後脛骨動脈は足底側を栄養しているためどちらも触知できていることが必要です。
どちらかのみ触知可 × 両方触知可 ○
両方の動脈触知が必要です。
触知ができない場合はドプラーで確認します。ドプラーで確認できれば装着可能です。



Q：オンダンセトロンを手術室で投与しているのはなぜ？

A:
術後悪心・嘔吐（PONV）予防のためです。
2022年2月に術後の消化器症状（悪心・嘔吐）に対する効能・効果が追加承認されました。



当院では全身麻酔全例・帝王切開術に投与しています。
投与時期は手術終了前から麻酔覚醒前ごろです。



成人



約12時間効果があります。塩酸メトクロプラミドとは作用機序が違うため、オンダンセトロン投与から時間が経っていても塩酸メトクロプラミドを使用することも可能です。

PONVリスクファクター	リスクスコア
女性	1点
非喫煙者	1点
PONV・乗り物酔いの既往	1点
術後のオピオイド使用	1点

➡
リスクファクターのスコアを合計

リスクスコア合計	発生リスク
0点	10%
1点	20%
2点	40%
3点	60%
4点	80%

小児

PONVリスクファクター	リスクスコア
手術時間30分以上	1点
3歳以上	1点
斜視手術	1点
PONV既往・血縁者のPONV既往	1点

➡
リスクファクターのスコアを合計

リスクスコア合計	発生リスク
0点	10%
1点	10%
2点	30%
3点	50%
4点	70%

手術や麻酔に関する質問などありましたら声をかけてください。